



Nevada Department of Agriculture

Help Prevent the Spread of Equine Infectious Anemia and Equine Piroplasmosis

Equine Infectious Anemia (EIA) and Equine Piroplasmosis (EP) are blood-borne diseases that affect horses, donkeys and mules. Both are spread through infected blood. There is no treatment for EIA. Infected animals show no signs of illness but can remain lifelong carriers and spread the disease to other animals. Positive EIA animals are placed under permanent movement restrictions or are euthanized. Unlike EIA, EP can be treated through a United States Department of Agriculture (USDA)-approved program. Animals receiving treatment must remain under strict quarantine for the duration of the treatment process.

High-Risk Practices That Spread Disease

Following safe practices help prevent the spread of EIA, EP and other blood-borne diseases.



Needles and Syringes

- Never share needles, syringes or IV equipment between animals
- Do not reuse disposable medical supplies
- Never insert a used needle into a medication vial



Medical and Dental Equipment

- Disinfect dental, surgical and other instruments between each animal
- Use proper sterilization protocols for all equipment that contacts blood

ALL interstate movement of equines require a current negative test for EIA within the previous 12 months per State and Federal regulations. For more information about equine health, testing requirements or reportable diseases, visit agri.nv.gov/Animals/Animal_Disease/Equine/ or contact your local veterinarian.



Departamento de Agricultura de Nevada

Ayuda a prevenir la propagación de la Anemia Infecciosa Equina y la Piroplasmosis Equina

La Anemia Infecciosa Equina (AIE) y la Piroplasmosis Equina (PE) son enfermedades transmitidas por la sangre que afectan a caballos, burros y mulas. Ambas se propagan a través de sangre infectada. No existe tratamiento para la AIE. Los animales infectados no presentan signos de enfermedad, pero pueden permanecer como portadores de por vida y transmitir la enfermedad a otros animales. Los animales que prueban positivo a la AIE son sujetos a restricciones permanentes de movimiento o son sometidos a eutanasia. A diferencia a AIE, la PE puede tratarse mediante un programa aprobado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. Los animales reciben tratamiento deben permanecer bajo estricta cuarentena durante todo el proceso de tratamiento.

Prácticas de alto riesgo que propagan enfermedades

Seguir prácticas seguras ayuda a prevenir la propagación de la AIE y PE y otras enfermedades transmitadas por la sangre.



Agujas y jeringas

- Nunca comparta agujas, jeringas o equipos de administración intravenosa entre animales
- No reutilice material médico desechable
- Nunca introduzca una aguja usada en un vial de medicación



Equipo médico y dental

- Desinfecte el instrumental dental, quirúrgico y de otro tipo entre cada animal
- Aplique los protocolos de esterilización adecuados para todo el equipo que entre en contacto con sangre

Todo movimiento interestatal de equinos requiere una prueba negativa vigente de EIA, realizada dentro de los 12 meses anteriores, de acuerdo con las regulaciones estatales y federales. Para obtener más información sobre la salud equina, los requisitos de pruebas o las enfermedades de declaración obligatoria, visite agri.nv.gov/Animals/Animal_Disease/Equine/ o comuníquese con su veterinario local.